

営農情報（作況情報：6月1日現在）

令和5年6月6日

第16号

【春まき小麦（春よ恋）】

○管内作況値

地域名	草丈 cm	茎数 本/m ²	備 考
管内平均 (管内作況値)	37.1	681.8	一部圃場で「うどんこ病」の発生が確認されています。

○各地区定点調査結果

地域名	草丈 cm	茎数 本/m ²	地域名	草丈 cm	茎数 本/m ²
光珠内	32.0	504	上美唄	34.3	631
岩 峰	31.8	800	豊葦	50.3	792

春まき小麦は必ず植物成長調整剤を散布しましょう！

本年の春まき小麦は播種時期がばらついており、圃場によって生育差が大きい状況です。また、多くの圃場で草丈が30cmを超えてきており、「サイコセルPRO」の散布適期となっているため、適期を逃さず散布しましょう。

○植物成長調整剤について

薬剤名	使用回数	使用時期	反当使用量	散布水量
サイコセルPRO	1回	6葉期前後 草丈30～40cm	150ml	100L/10a
カルタイムフロアブル	1回	止葉期～出穂始期	150ml	100L/10a
エスレル10	1回	止葉期	75～125倍	25L/10a
		止葉期～出穂始期	125倍	
		出穂始期	300～500倍	100L/10a
			300～1,000倍	
		125～250倍	25L/10a	

※使用量・使用時期を厳守し、多量散布や重複散布にならないように注意しましょう。

「うどんこ病」は見つけ次第防除を！

春まき小麦圃場の一部で「うどんこ病」の発生が確認されています。多湿条件で発生しやすくなりますので、罹病が確認されましたら、速やかに防除を実施しましょう。

○「うどんこ病」に有効な薬剤

薬剤名	使用回数	使用倍率	散布液量
ミリオネアフロアブル	2回以内	4,000倍	60～150L/10a
アミスター20フロアブル	3回以内	2,000～3,000倍	100～150L/10a

JAみねのぶ営農推進協議会
TEL 0126-67-2334 FAX 0126-67-2803