

# 営農情報（作況情報：6月15日現在）

令和5年6月20日

第20号

【春まき小麦（春よ恋）】

○管内作況値

地域名	草丈 cm	茎数 本/m <sup>2</sup>	備 考
管内平均 (管内作況値)	62.0	780	一部圃場で「うどんこ病」の発生が確認されています。

○各地区定点調査結果

地域名	草丈 cm	茎数 本/m <sup>2</sup>	地域名	草丈 cm	茎数 本/m <sup>2</sup>
光珠内	55.9	968	上美唄	58.5	640
岩 峰	65.0	664	豊葦	68.7	848

## 赤カビ病の適期防除に努めましょう！

現在、出穂期を迎えている圃場が散見され、間もなく赤カビ病の基幹防除がスタートします。防除の開始適期を逃さず、小麦を病気から守りましょう。

また、うどんこ病の発生も確認されておりますので、下表を参考に適切な防除を行いましょう。

○春まき小麦赤かび病防除体系

回数	薬 剤 名	使用 倍 率	備 考	うどんこ病登録
1回目 (選択)	リベロ水和剤	2,000倍	<b>開花極始</b>	○
	シルバキュアフロアブル	2,000倍		○
2回目	トップジンM水和剤	1,000～ 1,500倍	1回目から 5～7日後	○
3回目	シルバキュアフロアブル	2,000倍	2回目から 5～7日後	○
4回目	ベフラン液剤25※	1,000～ 2,000倍	3回目から 5～7日後	
臨機	チルト乳剤25※	1,000～ 2,000倍		○

※リベロ水和剤・シルバキュアフロアブル・チルト乳剤25は同系剤ですので連用は避けましょう。

※特に「はるきらり」については、粒に黒カビが付きやすいので、4回防除は必須としましょう。

## JAみねのぶ営農推進協議会

TEL 0126-67-2334 FAX 0126-67-2803